

فکر کوی چی تاسو په شري اخته یاست؟

که تاسو فکر کوی چی په شري اخته یاست، باید څه وکړئ

شري معمولا له تبې، ټوخي، بهېدونکې پوزې او د سترگو د سوروالي سره پیل کېږي چې وروسته بیا دانکی هم را پورته کېږي. که ستاسو په کورنۍ کې کوم څوک د شري نښې نښانې لري:

سمدلاسه یوه ډاکتر یا روغتون ته
زنگ ووهئ او ورته ووايست چې ستاسو په کور کې کوم څوک په شري اخته دی. هغوی به تاسو ته لارښوونې وکړي.

د کورنۍ ټول غړي باید په کور کې پاتې شي تر څو ستاسو ګاونډیان یا ستاسو له کور څخه بهر نور خلک ناروغ نشي.

د کورنۍ له هغو غړو څخه لرې پاتې شئ چې ناروغ نه دي.



په سختۍ سره
ساه اخیستل
(یا له نارمل حد څخه
چټکه ساه اخیستل)



د ساه اخیستو یا
ټوخي پر وخت د درد
احساس



د اوبو کموالی
(د پوزې او خولې وچېدل، کمې تشې
متیازې کول، له اوبښکو بهېدو پرته ژړا)



کله باید بېرني خونې ته لار شئ

که چېرته په ناروغۍ د اخته کس ناروغي په تدریج سره سختېږي یا له پورته ذکر شویو نښو نښانو څخه کومه یوه لري، نو ژر تر ژره یې د روغتون بېرني دپارتمنت ته بوځئ.

انتظار مه کوی.



دوامداره تبه یا
د سر درد



ګنگستیا، د هوبڼ
کموالی یا شدید
کمزورتیا



د خولې چاپېره آبي رنگ،
د انرژۍ کموالی یا پ
خوراک کې ستونزه
(د کم عمره ماشومانو لپاره)

له کوم چا وغواړئ چې ستاسو له رسېدو د مخه زنگ ووهئ. روغتون ته ووايست چې هغه شخص را روان دی کوم چې کېدای شي په شري اخته وي.