


سرخک صرفاً یک جوش کوچک نیست

سرخک بویژه برای نوزادان و کودکان خردسال می‌تواند خطرناک باشد.



جوش

(3 تا 5 روز پس از شروع علائم بروز می‌کند)



قرمزی و/یا آبریزش چشم



آبریزش بینی



سرفه



تب بالا

(ممکن است به بیش از 104 درجه فارنهایت برسد)

علائم سرخک معمولاً شامل موارد زیر است:

سرخک می‌تواند جدی باشد.

سرخک می‌تواند عوارض شدیدی برای سلامتی، از جمله ذات‌الریه، تورم مغز (آنسفالیت) و مرگ ایجاد کند.

از هر 20 کودک مبتلا به سرخک، 1 نفر به ذات‌الریه مبتلا می‌شود که شایع‌ترین علت مرگ ناشی از سرخک در کودکان خردسال است.



از هر 5 نفری که به سرخک مبتلا می‌شوند، 1 نفر در بیمارستان بستری می‌شود.



از هر 1000 نفر مبتلا به سرخک، 1 نفر دچار تورم مغز می‌شود که ممکن است منجر به آسیب مغزی شود.



از هر 1000 نفر مبتلا به سرخک، 1 تا 3 نفر جان خود را از دست می‌دهند.



**شما قدرت محافظت از
فرزندتان را دارید.**

با اطمینان از دریافت واکسن سرخک-اوریون-سرخه (MMR) برای فرزندانتان، محافظت ایمن و طولانی مدت در برابر سرخک فراهم کنید. با ارائه دهنده خدمات درمانی خود صحبت کنید.

**عوارض طولانی
مدت**

یک بیماری بسیار نادر اما کشنده به نام پانانسفالیت اسکروزان نیمه حاد می‌تواند ۷ تا ۱۰ سال پس از یافتن فرد از سرخک ایجاد شود.

