

HAY UN BROTE ACTUAL DE SARAMPIÓN

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa causada por un virus. Puede ser peligroso, especialmente para los bebés y los niños pequeños. Proteja a su familia y a su comunidad.



El sarampión se propaga por el aire cuando una persona enferma tose o estornuda. El virus puede permanecer en el aire durante 2 horas después de que la persona con sarampión se vaya del lugar. Es tan contagioso que aproximadamente 9 de cada 10 personas que se acercan a una persona con sarampión y no están protegidas por la vacuna también se infectarán.

Los síntomas del sarampión aparecen entre 7 y 14 días después del contacto con el virus. Los síntomas comunes del sarampión incluyen:



Fiebre alta
(puede alcanzar más de 40 °C)



Tos



Moqueo



Ojos rojos y/o llorosos




Sarpullido
(aparece de 3 a 5 días después del inicio de los síntomas)



Neumonía



Inflamación del cerebro
(encefalitis)



Incluso la muerte

La mejor manera de protegerse contra el sarampión...

es con la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR por sus siglas en inglés). Nunca es demasiado tarde para vacunarse. La vacunación ayuda a protegerle a usted, a quienes le rodean y a su comunidad. Si no está vacunado, considere quedarse en casa o lejos de lugares donde este mucha gente, hasta que disminuyan los casos de sarampión en el área, especialmente para proteger a los miembros de su familia que podrían enfermar gravemente.

Si cree que usted o algún familiar tiene sarampión, manténgase alejado de otras personas y llame a un médico, a un centro de atención de urgencias o a una sala de emergencias.

PREPÁRESE PARA EL SARAMPIÓN
cdc.gov/measles

